



068141/5005 GP

ES

Nervoheel_N

Comprimidos

Medicamento homeopático

Composición: 1 comprimido contiene: Acidum phosphoricum D4, Ignatia D4, Sepia officinalis D4 ana 60 mg; Kalium bromatum D4, Zincum isovalerianicum D4 ana 30 mg. Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Envase conteniendo 50 comprimidos de 301,5 mg.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n., 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Indicaciones terapéuticas: Medicamento tradicionalmente utilizado en síntomas nerviosos acompañados de agotamiento general, ansiedad y agitación nerviosa, trastornos psicosomáticos.

Contraindicaciones: Alergia conocida (hipersensibilidad) a alguna de las sustancias activas o excipientes.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento.

No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria.

Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

-Heel





Posología: Vía oral. Dosis estándar: Adultos y niños a partir de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día. Niños menores de 2 años: 1 comprimido 1 vez al día. Niños entre 2-5 años: 1 comprimido 1-2 veces al día. Niños entre 6-11 años: 1 comprimido 2 veces al día. En casos agudos: Adultos y niños a partir de 12 años: 1 comprimido cada $\frac{1}{2}$ -1 hora, hasta un máximo de 10 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar. Niños menores de 2 años: 1 comprimido cada 1-2 horas, hasta un máximo de 4 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar. Niños entre 2-5 años: 1 comprimido cada 1-2 horas, hasta un máximo de 6 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar. Niños entre 6-11 años: 1 comprimido cada 1-2 horas, hasta un máximo de 8 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar.

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: Pueden presentarse reacciones alérgicas (hipersensibilidad)(por ejemplo, alergias en la piel, malestar gastrointestinal) en casos muy raros (menos de 1 de cada 10.000 personas). Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

